

熊本医療センター 化学療法レジメン登録票

S-1(14d)+GEM(1000/D1,8)(3週毎) 療法

診療科	外科
がん種	膵癌
実施区分	外来可
適応分類	進行・再発がん 術後補助療法 ・ 術前補助療法 ・ 局所療法 ・ その他

1コース期間	21 日間	最大コース数(規定があれば)	コース
--------	-------	----------------	-----

催吐リスク	軽度
-------	----

★1コースの抗がん剤投与スケジュール

薬剤名	(略号)	投与量	催吐リスク	Day								
				1	...	8	...	14	15	...	21	
TS-1	S-1	備考欄参照	軽度	○	...	...	...	○				
ゲムシタピン	GEM	1000 mg/m <sup>2</sup>	軽度	○		○						

★備考欄

・TS-1 分2 (添付文書より1段階低い) 減量

14日間服用、7日間休薬

体表面積	1.25m <sup>2</sup> 未満	60mg/day(朝40mg、夕20mg)	50mg/day
	1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満	80mg/day	60mg/day(朝40mg、夕20mg)
	1.5m <sup>2</sup> 以上	100mg/day	80mg/day

・GEM: 血管痛予防のため5%糖液使用。30分で投与。

初回投与量	一段階減量	二段階減量
1000mg/m <sup>2</sup>	800mg/m <sup>2</sup>	600mg/m <sup>2</sup>

★備考欄

・GEM  
 投与当日の白血球数が2000/ $\mu$ L未満又は血小板数が7万/ $\mu$ L未満であれば、骨髄機能が回復するまで投与を延期すること。また、前治療により、骨髄機能が低下している患者では、骨髄抑制が強くあらわれることがあるので、これらの患者では投与量を適宜減量し、臨床検査値に十分注意すること。

・S-1: Ccr<30mL/minは原則投与不可。30<Ccr $\le$ 60では1段階以上の減量。(適正使用ガイドより)