

熊本医療センター 化学療法レジメン登録票

CDDP(25/D1,8) + GEM(1000/D1,8)(3週毎) 療法

診療科	外科
がん種	胆道癌
実施区分	外来可
適応分類	進行・再発がん、術後補助療法・術前補助療法・局所療法・その他

1コース期間	21 日間
--------	-------

最大コース数(規定があれば)	コース
----------------	-----

催吐リスク	中等度	※備考欄参照
-------	-----	--------

★1コースの抗がん剤投与スケジュール

薬剤名	(略号)	投与量	催吐リスク	Day						
				1	...	8	...	15	...	21
シスプラチン	CDDP	25 mg/m ²	高度	○		○				
ゲムシタピン	GEM	1000 mg/m ²	軽度	○		○				

★備考欄

GEM: 血管痛予防のため溶解に5%糖液使用。30分で投与。

※CDDP低用量のため、催吐リスクは中等度で作成

★参考文献(添付文書・適正使用ガイド・ポケットガイド・書籍・文献・臨床試験プロトコル・その他)

エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック2012 p.278

(CDDPの投与時間はDrと相談のうえ、決定)

★備考欄

GEM: 添付文書より

投与当日の白血球数が2000/μL未満又は血小板数が7万/μL未満であれば、骨髄機能が回復するまで投与を延期すること。また、前治療により、骨髄機能が低下している患者では、骨髄抑制が強くあらわれることがあるので、これらの患者では投与量を適宜減量し、臨床検査値に十分注意すること。

◆主な副作用とその対策(例:シスプラチン 嘔気、腎機能障害など)

--