

熊本医療センター 化学療法レジメン登録票

BEV(7.5/D1) + SOX(3週毎)

療法

診療科	外科
がん種	大腸癌
実施区分	外来可
適応分類	進行・再発がん 術後補助療法 ・ 術前補助療法 ・ 局所療法 ・ その他

1コース期間	21 日間	最大コース数(規定があれば)	コース
--------	-------	----------------	-----

催吐リスク	中等度
-------	-----

★1コースの抗がん剤投与スケジュール

薬剤名	(略号)	投与量	催吐リスク	Day						
				1	...	14	15	...	21	
ペバシズマブ	BEV	7.5 mg/kg	最小度	○						
オキサリプラチン	L-OHP	130 mg/m ²	中等度	○						
TS-1	S-1	備考欄参照	軽度	○	...	○				

★備考欄

・BEV: 初回は90分で投与。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。

・TS-1 分2 14日間服用、7日間休薬

体表面積	初回投与量	1段階減量	2段階減量
1.25m ² 未満	80mg/day	60mg/day*	50mg/day
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	100mg/day	80mg/day	60mg/day*
1.5m ² 以上	120mg/day	100mg/day	80mg/day

*朝40mg、夕20mg

・L-OHP

初回投与量	130mg/m ²
1段階減量	100mg/m ²
2段階減量	75mg/m ²

※共にSOFT試験プロトコール参照

★備考欄

・S-1: Ccr<30mL/minは原則投与不可。30<Ccr≤60では1段階以上の減量。(適正使用ガイドより)

・SOFT試験プロトコールにおける減量基準

	減量基準	S-1	L-OHP
WBC(m ³)	1000未満	1段階減量	1段階減量
Neutro(m ³)	500未満	1段階減量	1段階減量
Plt(m ³)	50,000未満	1段階減量	1段階減量
	50,000以上75,000未満	-	1段階減量
下痢	G3以上	1段階減量	1段階減量
発熱性好中球減少症	G3以上	1段階減量	-