

| レジメン名 | 投与日 (day) | 抗がん剤 (一般名) | 用量 | 投与方法 | 1クール |
|--|-------------------------|------------|----------------------|------|------|
| FP : CDDP(80/D1)+5-FU(800/D1-5)(3週毎) | day1 | シスプラチン | 80mg/m ² | 点滴静注 | 21日 |
| | day1-5 | フルオロウラシル | 800mg/m ² | 点滴静注 | |
| FP : CDDP(80/D1)+5-FU(800/D1-5)(4週毎) | day1 | シスプラチン | 80mg/m ² | 点滴静注 | 28日 |
| | day1-5 | フルオロウラシル | 800mg/m ² | 点滴静注 | |
| mDCF (3週毎) | day1 | ドセタキセル | 60mg/m ² | 点滴静注 | 21日 |
| | day1-5 | シスプラチン | 6mg/m ² | 点滴静注 | |
| | day1-5 | フルオロウラシル | 350mg/m ² | 点滴静注 | |
| DTX(70/D1)(3週毎) | day1 | ドセタキセル | 70mg/m ² | 点滴静注 | 21日 |
| Weekly PTX(100/D1, 8, 15, 22, 29, 36)(8週毎) | day1, 8, 15, 22, 29, 36 | パクリタキセル | 100mg/m ² | 点滴静注 | 56日 |
| NDP(80/D1)+5-FU(800/D1-5) (4週毎) | day1 | ネダプラチン | 80mg/m ² | 点滴静注 | 28日 |
| | day1-5 | フルオロウラシル | 800mg/m ² | 点滴静注 | |
| RT併用FP : CDDP(40)+5-FU(400)(5週毎) | day1, 8 | シスプラチン | 40mg/m ² | 点滴静注 | 35日 |
| | day1-5, 8-12 | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 点滴静注 | |
| Pembrolizumab+FP:CDDP(80/D1)+5-FU(800/D1-5)(3週毎) | day1 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | 21日 |
| | day1 | シスプラチン | 80mg/m ² | 点滴静注 | |
| | day1-5 | フルオロウラシル | 800mg/m ² | 点滴静注 | |
| RT併用FP : CDDP(70/D1)+5-FU(700/D1-4)(4週毎) | day1 | シスプラチン | 70mg/m ² | 点滴静注 | 28日 |
| | day1-4 | フルオロウラシル | 700mg/m ² | 点滴静注 | |
| 術前DCF : DTX(70/D1)+CDDP(70/D1)+5-FU(750/D1-5) | day1 | ドセタキセル | 70mg/m ² | 点滴静注 | 21日 |
| | day1 | シスプラチン | 70mg/m ² | 点滴静注 | |
| | day1-5 | フルオロウラシル | 750mg/m ² | 点滴静注 | |
| ペムブロリズマブ(3週毎) | day1 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | 21日 |
| ペムブロリズマブ(6週毎) | day1 | ペムブロリズマブ | 400mg/body | 点滴静注 | 42日 |
| ニボルマブ (2週毎) | day1 | ニボルマブ | 240mg/body | 点滴静注 | 14日 |
| ニボルマブ (4週毎) | day1 | ニボルマブ | 480mg/body | 点滴静注 | 28日 |