

レジメン名	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	投与方法	1クール
S-1(21d)+CCDP (60/D8) (5週毎)	day1-21 day8	テガフル・ギメラシル・オテラシル シスプラチン	80mg/m ² /day (80~120mg/day) 60mg/m ²	経口 点滴静注	35日
XP : Cape(14d)+CCDP(80/D1)(3週毎)	day1-14 day1	カベシタピン シスプラチン	2000mg/m ² /day 【C法】 80mg/m ²	経口 点滴静注	21日
Triweekly HER+XP(3週毎) 初回投与	day1-14 day1 day1	カベシタピン トラスツズマブ シスプラチン	2000mg/m ² /day 【C法】 8mg/kg 80mg/m ²	経口 点滴静注 点滴静注	21日
Triweekly HER+XP(3週毎) 2回目以降	day1-14 day1 day1	カベシタピン トラスツズマブ シスプラチン	2000mg/m ² /day 【C法】 6mg/kg 80mg/m ²	経口 点滴静注 点滴静注	21日
Triweekly HER(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	21日
Triweekly HER(3週毎) 2回目以降	day1	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	21日
Triweekly HER+XELOX(3週毎) (初回投与)	day1-14 day1 day1	カベシタピン トラスツズマブ オキサリプラチン	2000mg/m ² /day 【C法】 8mg/kg 130mg/m ²	経口 点滴静注 点滴静注	21日
Triweekly HER+XELOX(3週毎) (2回目以降)	day1-14 day1 day1	カベシタピン トラスツズマブ オキサリプラチン	2000mg/m ² /day 【C法】 6mg/kg 130mg/m ²	経口 点滴静注 点滴静注	21日
Triweekly HER+SOX(3週毎) (初回投与)	day1-14 day1 day1	テガフル・ギメラシル・オテラシル トラスツズマブ オキサリプラチン	80mg/m ² /day (80~120mg/day) 8mg/kg 130mg/m ²	経口 点滴静注 点滴静注	21日
Triweekly HER+SOX(3週毎) (2回目以降)	day1-14 day1 day1	テガフル・ギメラシル・オテラシル トラスツズマブ オキサリプラチン	80mg/m ² /day (80~120mg/day) 6mg/kg 130mg/m ²	経口 点滴静注 点滴静注	21日
CPT-11(100/D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 8, 15	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注	28日
CPT-11(150/D1, 15)(5週毎)	day1, 15	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	35日
S-1 (14d) +CPT-11(80/D1, 8)(4週毎)	day1-14 day1, 8	テガフル・ギメラシル・オテラシル イリノテカン	80mg/m ² /day (80~120mg/day) 80mg/m ²	経口 点滴静注	28日
Weekly PTX(80/D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 8, 15	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	28日
Triweekly PTX(210/D1)(3週毎)	day1	パクリタキセル	210mg/m ²	点滴静注	21日
S-1(14d)+PTX(50/D1, 8)(3週毎)	day1-14 day1, 8	テガフル・ギメラシル・オテラシル パクリタキセル	80mg/m ² /day (80~120mg/day) 50mg/m ²	経口 点滴静注	21日
Nab-PTX(3週毎)	day1	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260mg/m ²	点滴静注	21日
Weekly Nab-PTX(100/D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 8, 15	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	28日
DTX(70/D1)(3週毎)	day1	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注	21日
S-1 (14d) +DTX(40/D1)(3週毎)	day1-14 day1	テガフル・ギメラシル・オテラシル ドセタキセル	80mg/m ² /day (80~120mg/day) 40mg/m ²	経口 点滴静注	21日
SOX(3週毎) [TS-1(14d) + L-OHP(130/D1)]	day1-14 day1	テガフル・ギメラシル・オテラシル オキサリプラチン	80mg/m ² /day (80~120mg/day) 130mg/m ²	経口 点滴静注	21日
XELOX(3週毎) [Cape(14d) + L-OHP(130/D1)]	day1-14 day1	カベシタピン オキサリプラチン	2000mg/m ² /day 【C法】 130mg/m ²	経口 点滴静注	21日
Ramucirumab(8/D1, 15) + PTX(80/D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 15 day1, 8, 15	ラムシルマブ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	28日
Ramucirumab(8/D1)(2週毎)	day1	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	14日
Ramucirumab(8/D1, 15)+Nab-PTX(100/D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 15 day1, 8, 15	ラムシルマブ アルブミン懸濁型パクリタキセル	8mg/kg 100mg/m ²	点滴静注 点滴静注	28日
Trastuzumab deruxtecan (3週毎) 【胃がん】	day1	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	点滴静注	21日
HER+mFOLFOX6 (6週毎) 【初回用】	day1 day22 day1, 15, 29 day1, 15, 29 day1, 15, 29 day1, 15, 29	トラスツズマブ トラスツズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオウラシル フルオウラシル	8mg/kg 6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 急速静注 持続静注 (46時間)	42日
HER+mFOLFOX6 (6週毎) 【2回目以降】	day1, 22 day1, 15, 29 day1, 15, 29 day1, 15, 29 day1, 15, 29	トラスツズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオウラシル フルオウラシル	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 急速静注 持続静注 (46時間)	42日
Nivo+CapeOX(3週毎)	day1-14 day1 day1	カベシタピン ニボルマブ オキサリプラチン	2000mg/m ² /day 【C法】 360mg/body 130mg/m ²	経口 点滴静注 点滴静注	21日
Nivo+SOX(3週毎)	day1-14 day1 day1	テガフル・ギメラシル・オテラシル ニボルマブ オキサリプラチン	80mg/m ² /day (80~120mg/day) 360mg/body 130mg/m ²	経口 点滴静注 点滴静注	21日
Nivo+mFOLFOX6 (2週毎)	day1 day1 day1 day1	ニボルマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオウラシル	240mg/body 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 急速静注	14日
	day1	フルオウラシル	2400mg/m ²	持続静注 (46時間)	