

レジメン名	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	投与方法	1クール
AC (3週毎)	day1	ドキソルビシン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
	day1	シクロフォスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
EC (3週毎)	day1	エビルピシン	90mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
	day1	シクロフォスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
FEC(3週毎)	day1	フルオロウラシル	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
	day1	エビルピシン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	シクロフォスファミド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
wHER 初回投与	day1	トラスツズマブ	4mg/kg	点滴静注	7日
wHER 2回目以降	day1	トラスツズマブ	2mg/kg	点滴静注	7日
Triweekly HER(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	21日
Triweekly HER(3週毎) 2回目以降	day1	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	21日
Weekly PTX(80/D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 8, 15	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	28日
wHER+wPTX(80/D1, 8, 15)(4週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	4mg/kg	点滴静注	28日
	day8, 15, 22	トラスツズマブ	2mg/kg	点滴静注	
	day1, 8, 15	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
wHER+wPTX(80/D1, 8, 15)(4週毎) 2回目以降	day1, 8, 15, 22	トラスツズマブ	2mg/kg	点滴静注	28日
	day1, 8, 15	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
DTX(75/D1)(3週毎)	day1	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
Triweekly HER+DTX(75/D1)(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	21日
	day1	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Triweekly HER+DTX(75/D1)(3週毎) 2回目以降	day1	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	21日
	day1	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
VNR(25/D1, 8)(3週毎)	day1, 8	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
wHER+wVNR(25/D1, 8)(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	4mg/kg	点滴静注	21日
	day8, 15	トラスツズマブ	2mg/kg	点滴静注	
	day1, 8	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
wHER+wVNR(25/D1, 8)(3週毎) 2回目以降	day1, 8, 15	トラスツズマブ	2mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Triweekly HER+VNR(25/D1, 8)(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Triweekly HER+VNR(25/D1, 8)(3週毎) 2回目以降	day1	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
GEM(1250/D1, 8)(3週毎)	day1, 8	ゲムシタピン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
wHER+wGEM(1250/D1, 8)(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	4mg/kg	点滴静注	21日
	day8, 15	トラスツズマブ	2mg/kg	点滴静注	
	day1, 8	ゲムシタピン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
wHER+wGEM(1250/D1, 8)(3週毎) 2回目以降	day1, 8, 15	トラスツズマブ	2mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	ゲムシタピン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Triweekly HER+GEM(1250/D1, 8)(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	ゲムシタピン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Triweekly HER+GEM(1250/D1, 8)(3週毎) 2回目以降	day1	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	ゲムシタピン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
TC : DTX(75/D1)+CPA (600/D1)(3週毎)	day1	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
	day1	シクロフォスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Triweekly HER+TC : DTX+CPA(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	21日
	day1	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	シクロフォスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Triweekly HER+TC : DTX+CPA(3週毎) 2回目以降	day1	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	21日
	day1	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	シクロフォスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Nab-PTX(3週毎)	day1	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
Triweekly HER+Nab-PTX(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	21日
	day1	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Triweekly HER+Nab-PTX(3週毎) 2回目以降	day1	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	21日
	day1	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
GEM(1250/D1, 8) + PTX(175/D1)(3週毎)	day1, 8	ゲムシタピン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
	day1	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
TriweeklyHER+GEM(1250/D1, 8)+PTX(175/D1)(3週毎)初回	day1	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	ゲムシタピン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
TriweeklyHER+GEM(1250/D1, 8)+PTX(175/D1)(3週)2回以	day1	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	ゲムシタピン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Eribulin(1.4/D1, 8)(3週毎)	day1, 8	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
Triweekly HER + Eribulin(1.4/D1, 8)(3週毎) 初回投与	day1	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Triweekly HER + Eribulin(1.4/D1, 8)(3週毎)2回目以降	day1	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	21日
	day1, 8	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	

レジメン名	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	投与方法	1クール
Classical CMF (4週毎)	day1-14	シクロフォスファミド	100mg/m <sup>2</sup> BSA<1.5m <sup>2</sup> : 100mg BSA≧1.5m <sup>2</sup> : 150mg	経口	28日
	day1, 8	メトトレキサート	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1, 8	フルオロウラシル	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
BEV(10/D1, 15)+Weekly PTX(90/D1, 8, 15)(4週毎) 【BS】	day1, 15	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注	28日
	day1, 8, 15	パクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
トラスツズマブ エムタンシン (3週毎)	day1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注	21日
Trastuzumab deruxtecan (3週毎) [乳がん]	day1	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	点滴静注	21日
Pembrolizumab(200mg/q3w)+Nab-PTX(100mg/m <sup>2</sup> , 3投1休)	day1, 22, 43, 64	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	84日
	day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Pembrolizumab(200mg/q3w)+PTX(90mg/m <sup>2</sup> , 3投1休)	day1, 22, 43, 64	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	84日
	day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71	パクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Pembrolizumab+GEM(1000/D1, 8)+CBDCA(2/D1, 8)(3週毎)	day1	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	21日
	day1, 8	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1, 8	カルボプラチン	AUC2	点滴静注	
Atezolizumab(840/D1, 15)+Nab-PTX(100/D1, 8, 15)(q4w)	day1, 15	アテゾリズマブ	840mg/body	点滴静注	28日
	day1, 8, 15	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	