

レジメン名	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	投与方法	1クール
GEM(1000/D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 8, 15	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	28日
S-1(14d)+GEM(1000/D1, 8)(3週毎)	day1-14	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m <sup>2</sup> /day (80~120mg/day)	経口	21日
	day1, 8	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
Radiation+GEM(600/D1, 8)(3週毎)	day1, 8	ゲムシタピン	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	21日
Nab-PTX(125/D1, 8, 15)+GEM(1000/D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 8, 15	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	28日
	day1, 8, 15	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
FOLFIRINOX(2週毎)	day1	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	14日
	day1	イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	
	day1	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注 (46時間)	
mFOLFIRINOX(2週毎)	day1	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	14日
	day1	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注 (46時間)	
onivyde+5-FU/LV (2週毎)	day1	イリノテカン (リボソーム製剤)	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	14日
	day1	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	
	day1	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注 (46時間)	