

レジメン名	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	投与方法	1クール
GEM(1000/D1, 8, 15)(4週毎)	day1, 8, 15	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	28日
S-1(14d)+GEM(1000/D1, 8)(3週毎)	day1-14 day1, 8	テガフル・ギメラシル・オテラシル ゲムシタビン	60~100mg/day 1000mg/m ²	経口 点滴静注	21日
CDDP (25/D1, 8) +GEM(1000/D1, 8)(3週毎)	day1, 8 day1, 8	シスプラチン ゲムシタビン	25mg/m ² 1000mg/m ²	点滴静注 点滴静注	21日
Durvalumab(D1)+GEM(D1, 8)+CDDP(D1, 8)(q3w)(30kg以下)	day1 day1, 8 day1, 8	デュルバルマブ シスプラチン ゲムシタビン	20mg/kg 25mg/m ² 1000mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	21日
Durvalumab(D1)+GEM(D1, 8)+CDDP(D1, 8)(q3w) (30kg超)	day1 day1, 8 day1, 8	デュルバルマブ シスプラチン ゲムシタビン	1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	21日
Durvalumab (4週毎) 【30kg以下】	day1	デュルバルマブ	20mg/kg	点滴静注	28日
Durvalumab (4週毎) 【30kg超】	day1	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	28日