

# 急性骨髄性白血病 CAG療法を受けられる患者さまへ

月 日	経過	入院日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
治療・薬剤 (点滴・内服)			キロサイド(皮下注射 朝)														○点滴 ・栄養 ・抗菌薬(熱が出たり感染が疑わしい時)  ○輸血(貧血がある時や血小板数が下がっている時)															
			吐き気止め(点滴 朝) (30分)																													
			アクラシノン(点滴 朝) (30分)																													
			キロサイド(皮下注射 夕方)																													
			グランシリンジ(皮下注射 夕方)																													
処置			この図はあくまでも標準的な経過です。 症状に関しては、個人差がありますので、すべての方がこの通りの経過を辿るとは限りません。																													
症状の出現時期	白血球数 血小板数																															
	皮疹																															
	口内炎																															
	吐き気 食欲低下																															
	発熱																															
	検査	<ul style="list-style-type: none"> <li>●体重測定(治療中1日2回 7時、16時)</li> <li>●蓄尿(治療中のみ)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○血液検査(週2回~3回)</li> <li>○血液の細菌培養検査(発熱時)</li> </ul>																														
活動	クリーンベッド内またはクリーンエリア内																															
食事	普通食(白血球数が減ったときは、生もの禁止食) <span style="margin-left: 150px;">生もの禁止食</span> <span style="margin-left: 150px;">白血球数が回復したら、普通食に戻ります</span>																															
清潔	シャワー浴できます <ul style="list-style-type: none"> <li>●うがい(少なくとも1日5回 起床時、毎食前後、寝る前)</li> <li>●食後の歯磨き</li> <li>●手洗い</li> </ul>																															
排泄	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排便後は必ずウォシュレットを使用</li> </ul>																															
患者様及び御家族への説明	薬剤師が内服について説明いたします																															

\*この表は治療の目安です 患者様の状態によって変わる事があります