

熊本医療センター 化学療法レジメン登録票

XELOX(3週毎)

療法

診療科	外科
がん種	大腸癌
実施区分	外来可
適応分類	進行・再発がん・術後補助療法・術前補助療法・局所療法・その他

1コース期間	21 日間
--------	-------

最大コース数(規定があれば)	コース
----------------	-----

催吐リスク	中等度
-------	-----

★1コースの抗がん剤投与スケジュール

薬剤名	(略号)	投与量	催吐リスク	Day						
				1	...	14	15	...	21	
オキサリプラチン	L-OHP	130 mg/m <sup>2</sup>	中等度	○						
カペシタビン	Cape	2000 mg/m <sup>2</sup>	軽度	○	...	○				

★備考欄

・Cape C法(2000mg/m<sup>2</sup>/day)

1日2回朝夕食後 14日間服用、7日間休薬

体表面積	初回用量	1段階減量	2段階減量
1.36m <sup>2</sup> 未満	2,400mg/回	1,800mg/回	1,200mg/回
1.36m <sup>2</sup> 以上1.41m <sup>2</sup> 未満	3,000mg/回		
1.41m <sup>2</sup> 以上1.51m <sup>2</sup> 未満		2,400mg/回	
1.51m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満			1,800mg/回
1.66m <sup>2</sup> 以上1.81m <sup>2</sup> 未満	3,600mg/回		
1.81m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満		13,000mg/回	
1.96m <sup>2</sup> 以上	4,200mg/回		

★備考欄

・血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準

Grade	発現回数	Cape	L-OHP
G3	1	1段階減量	100mg/m <sup>2</sup>
	2	2段階減量	85mg/m <sup>2</sup>
G4	1	中止もしくは2段階減量	中止もしくは85mg/m <sup>2</sup>

・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準

Grade	発現回数	Cape	L-OHP
G2	1	変更なし	変更なし
	2	1段階減量	変更なし
	3	2段階減量	変更なし
G3	1	1段階減量	100mg/m <sup>2</sup>
	2	2段階減量	85mg/m <sup>2</sup>
G4	1	中止もしくは2段階減量	中止もしくは85mg/m <sup>2</sup>

ゼローダ適正使用ガイド参照