

熊本医療センター 化学療法レジメン登録票

BEV(7.5/D1) + XELOX(3週毎)

療法

| | |
|------|--------------------------------|
| 診療科 | 外科 |
| がん種 | 大腸癌 |
| 実施区分 | 外来可 |
| 適応分類 | 進行・再発がん 術後補助療法・術前補助療法・局所療法・その他 |

| | | | |
|--------|-------|----------------|-----|
| 1コース期間 | 21 日間 | 最大コース数(規定があれば) | コース |
|--------|-------|----------------|-----|

| | |
|-------|-----|
| 催吐リスク | 中等度 |
|-------|-----|

★1コースの抗がん剤投与スケジュール

| 薬剤名 | (略号) | 投与量 | 催吐リスク | Day | | | | | | |
|----------|-------|------------------------|-------|-----|-----|----|----|-----|----|--|
| | | | | 1 | ... | 14 | 15 | ... | 21 | |
| ペバシズマブ | BEV | 7.5 mg/kg | 最小度 | ○ | | | | | | |
| オキサリプラチン | L-OHP | 130 mg/m ² | 中等度 | ○ | | | | | | |
| カペシタビン | Cape | 2000 mg/m ² | 軽度 | ○ | ... | ○ | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

★備考欄

・BEV: 初回は90分で投与。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。

・Cape C法(2000mg/m²/day)

1日2回朝夕食後 14日間服用、7日間休薬

| 体表面積 | 初回用量 | 1段階減量 | 2段階減量 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 1.36m ² 未満 | 2,400mg/回 | 1,800mg/回 | 1,200mg/回 |
| 1.36m ² 以上1.41m ² 未満 | 3,000mg/回 | | |
| 1.41m ² 以上1.51m ² 未満 | | 2,400mg/回 | |
| 1.51m ² 以上1.66m ² 未満 | | | 1,800mg/回 |
| 1.66m ² 以上1.81m ² 未満 | 3,600mg/回 | | |
| 1.81m ² 以上1.96m ² 未満 | | 13,000mg/回 | |
| 1.96m ² 以上 | 4,200mg/回 | | |

★備考欄

・血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準

| Grade | 発現回数 | Cape | L-OHP | BEV |
|-------|------|-------------|---------------------------|------------|
| G3 | 1 | 1段階減量 | 100mg/m ² | 変更なし |
| | 2 | 2段階減量 | 85mg/m ² | 変更なし |
| G4 | 1 | 中止もしくは2段階減量 | 中止もしくは85mg/m ² | 中止もしくは変更なし |

・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準

| Grade | 発現回数 | Cape | L-OHP | BEV |
|-------|------|-------------|---------------------------|------------|
| G2 | 1 | 変更なし | 変更なし | 変更なし |
| | 2 | 1段階減量 | 変更なし | 変更なし |
| | 3 | 2段階減量 | 変更なし | 変更なし |
| G3 | 1 | 1段階減量 | 100mg/m ² | 変更なし |
| | 2 | 2段階減量 | 85mg/m ² | 変更なし |
| G4 | 1 | 中止もしくは2段階減量 | 中止もしくは85mg/m ² | 中止もしくは変更なし |

ゼロータ適正使用ガイド参照